

# Entwurf

## Vorläufiger Bewertungsrahmen für die FFH Anhang-II Art

### Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

Bewertungs- schema	A - sehr gut	B - gut	C - mittelschlecht	D – nicht signifikant
<b>Population (P.)</b>				
<b>Populations- größe</b>	grosse P. > 2000 Tiere	mittelgrosse P. 500 – 2000 Tiere	kleine P. < 500 Tiere	kein Nachweis
<b>P.-Struktur</b>	alle Altersklassen py- ramidenförmig vertre- ten, Reproduktion jähr- lich erfolgreich	fast alle Alters-klassen vertreten, nicht pyra- miden-förmiger Auf- bau, Reproduktion unregelmäßig	nur einzelne Altersklas- sen, Reproduktion nicht jedes Jahr erfolgreich	keine Populati- on
<b>P.-Dynamik</b>	P. stabil oder wachsend	P. stabil oder schwan- kend	P. abnehmend oder mit bestandsgefährdenden Schwank-ungen	keine Populati- on
<b>Grad der Au- tochthonie</b>	autochthoner Bestand, > 95 %	autochthoner Bestand, > 50 %	autochthoner Bestand, < 50 %	allochthoner Bestand
<b>Habitatstrukturen</b>				
<b>Gewässerle- bens-raum (GLR) adulter Tiere</b>	grosse Flächen feinen Sandes ohne Ver- schlammung oder Sau- erstoffarmut	kleine Sandflächen, Anzeichen von Ver- schlammung oder Sauerstoff-armut	kaum Flächen feinen Sandes, deutliche Ver- schlammung oder Sau- erstoffarmut	fehlende ge- eignete GLR
<b>Gewässerle- bensraum für Jungtiere</b>	grosse bodennahe Pflanzenbestände ohne Verschlammung oder Sauerstoffarmut	bodennahe Pfl.bestände, kaum Verschlammung oder Sauerstoffarmut	kaum bodennahe Pfl.bestände, deutliche Verschlammung oder Sauerstoffarmut	fehlende ge- eignete GLR
<b>Eiablageplätze (EPL)</b>	zahlreiche Polster dichter Vegetation nahe bei den GLR	wenige Veg.polster dichter, überwiegend nahe bei GLR	kaum Polster dichter Vegetation, nicht nahe bei den GLR	geeignete EPL fehlen
<b>Beeinträchtigung</b>				
<b>Gewässerle- bensraum (GLR) adulter Tiere</b>	B. nicht erkennbar oder nur sehr gering	geringe B., z.B. Lauf- regulierung, leichter Uferverbau, geringer Fischbesatz	starke B., z.B. starker Uferverbau, Sohlschwellen, intens. Aalbesatz	
<b>Gewässerle- bensraum für Jungtiere</b>	B. nicht erkennbar oder nur sehr gering	geringe B., leichte Grabenunterhaltung	starke B., intensive Grabenräumung	
<b>Eiablageplätze (EPL)</b>	B. nicht erkennbar oder nur sehr gering	geringe B., teilweise Pflanzenschädigung	starke B., Zerstörung von dichten Pfl.polstern	

#### Quelle:

KORTE, E.; ALBRECHT, U. & BERG, T. (2003): Landesweites Artengutachten für den Steinbeißer (*Cobitis taenia*). – unveröffentl. Gutachten des Büro für fisch & gewässerökologische Studien ( BFS) im Auftrag des HDLGN, 13 S.